

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA DẠ YẾN THẢO TRONG CHẬU

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-SNN ngày tháng 6 năm 2021
của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định)

1. Giống

Sử dụng cây giống cây mô đạt chuẩn: Chiều cao cây 5 – 7 cm, số lá 4 – 6 lá, đường kính thân 0,2 cm, số rễ >4. Trong trường hợp cây trong vỉ thường nhỏ nên cần bầu cây vào ly sau đó mới trồng vào chậu (chậu treo 8).

2. Thời vụ

Trồng hoa Dạ yến thảo quanh năm, nhưng tốt nhất là mùa Xuân nắng nhiều cho hoa rực rỡ, năng suất và chất lượng hoa tốt nhất, nâng cao giá trị kinh tế, trồng hoa tết xuống giống từ 09 – 15/9 (âm lịch). Tuy nhiên trồng hoa Dạ yến thảo trong nhà có mái che nắng hoặc mưa mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trồng trong điều kiện bình thường không có mái che.

3. Đất trồng và kỹ thuật làm đất

- Chuẩn bị vật liệu trồng bao gồm vỏ đậu phộng, phân gà, tro, theo tỉ lệ 3:1:1.

- Cách xử lý giá thể: vỏ đậu phộng, phân gà, được trộn theo tỉ lệ 3:1, thời gian ủ 3,5 tháng, cứ 10 – 15 ngày đảo đồng ủ một lần, và kiểm tra ẩm độ đồng ủ khoảng 50 - 60% là phù hợp (*Khi bóp một nắm đồng ủ trong tay có cảm giác ướt nhưng nước không chảy ra ngoài là đủ độ ẩm*). Sau 3,5 tháng tiến hành trộn 1 phần tro và dùng 1kg chế phẩm Trichoderma trộn đều cho 1,5 - 2 tấn nguyên liệu, ủ kín 15 – 20 ngày sau đó cho vào chậu trồng cây.

(Ghi chú: Kiểm tra đồng ủ khi thấy cỏ mọc lên là đủ điều kiện để trồng cây).

- Mật độ trồng: Tùy thuộc vào kích thước, kiểu dáng khác nhau mà lựa chọn số cây trồng trong chậu cho phù hợp. Hiện nay chậu có đường kính 20 – 25 cm được sử dụng phổ biến và trồng 01 cây/chậu; trồng cây vào buổi chiều, sau khi trồng tưới đầm nước.

4. Bón phân

- Bón lót (giai đoạn cây con): NPK 30-10-10.

- Bón thúc: (giai đoạn sinh trưởng phát triển): NPK 20-30-30.

- Trường hợp cây đã tốt mà chưa ra hoa có thể bón thêm 10-30-30. Ngoài ra cần bón thêm phân gà với liều lượng 2g/chậu định kỳ 15 ngày/lần. Riêng phân NPK định kỳ bón 5 – 7 ngày/lần.

5. Chăm sóc

5.1. Tưới nước

Tưới nước vào sáng sớm đủ ẩm, không tưới thừa nước cây dễ bị thối rễ.

Pha phân NPK ra nước tưới là tốt nhất, hạn chế bón rải hạt vì cây rất dễ chết đối với phân có độ pH cao.

Khi mới trồng xong luôn tưới đẫm nước một vài ngày đầu, để chúng có thời gian phục hồi, ngoài ra có thể tưới bổ sung thêm dung dịch nước hòa tan vitamin B1 pha loãng giúp cây chống sốc và kích thích ra rễ mới.

5.2. Bấm đọt

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển của cây hoa dạ yến thảo để có hướng xử lý kịp thời.

Có thể bấm đọt 03 lần:

- + Lần 1: Sau khi trồng 5 – 7 ngày.
- + Lần 2: Cách lần 1 từ 5 – 7 ngày.
- + Lần 3: Cách lần 2 từ 7 – 10 ngày.
- Cây tốt sẽ ra hoa sau 5 – 6 tuần trồng.

6. Phòng trừ sâu bệnh

Một số sâu bệnh hại chính trên cây Dạ yến thảo như: Bệnh đốm lá, vàng lá, héo rũ mốc trắng, sâu ăn lá, rệp sáp,

Sử dụng tổng hợp các biện pháp quản lý dịch hại theo IPM, chú ý sử dụng biện pháp phòng bệnh là chủ yếu.

7. Xuất vườn

Sau trồng khoảng 6 - 7 tuần, dạ yến thảo sẽ ra hoa và xuất bán. Khi vận chuyển chú ý va chạm, gãy đập hoa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kết quả Đề tài NCKH của tỉnh Bình Định do Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Bình Định thực hiện, nghiệm thu 2019.

- Quy trình thâm canh một số giống hoa ngắn ngày (Ban hành theo Quyết định số: 1129 /QĐ-SNN ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định).